



Les femmes et l'accès à la santé

Nadia AUZANNEAU
OpinionWay

Méthodologie



Méthodologie et échantillon

- ▶ **Mode de recueil** : Online sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) au sein de notre panel online NEWPANEL®

- ▶ **Description des cibles interrogées** :

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

- ▶ **Hommes/Femmes**
- ▶ **18 ans et plus**

- ▶ **16 à 60 ans**

Echantillons nationaux représentatifs constitués selon la méthode des quotas, au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence et catégorie d'agglomération

- ▶ **Zone géographique** : France métropolitaine
- ▶ **Période d'enquête** : du 29 septembre au 4 octobre 2011

Profil des répondants « Echantillon national représentatif »

Echantillon national représentatif 18+

	Echantillon national représentatif (18 ans et +) n= 1002
Sexe	
Hommes	48%
Femmes	52%
Age	
18/24	11%
25/34	15%
35/39	10%
40/44	9%
45/54	15%
55/64	18%
65 et +	21%
Régions	
Ile de France	18%
Nord Ouest	24%
Nord Est	24%
Sud Ouest	11%
Sud Est	23%
Catégorie d'agglomération	
Rural	26%
Moins de 20 000	17%
20 000 à 99 000 habitants	13%
100 000 et +	28%
Agglomération parisienne	16%

	Echantillon national représentatif (18 ans et +) n= 1002
Professions	
CSP +	26%
CSP -	31%
Inactifs	43%
Statut marital	
Célibataire	29%
En couple	39%
Pacsé ou marié	32%
Nombre d'enfants	
Sans enfant	37%
1 enfant	18%
2 enfants	26%
3 enfants et plus	19%
Détenteur d'une mutuelle	
Oui	95%
Non	5%

Profil des répondants

Femmes

16-60 ans

	Femmes n= 521
Age	
ST 16/17 ans	4%
ST 18/24	15%
ST 25/34	24%
ST 35/39	13%
ST 40/44	13%
ST 45/54	21%
ST 55/60	10%
ST 50 et +	20%
Régions	
Ile de France	20%
Nord Ouest	22%
Nord Est	24%
Sud Ouest	10%
Sud Est	24%
Catégorie d'agglomération	
Rural	20%
Moins de 20 000	19%
20 000 à 99 000 habitants	13%
100 000 et +	30%
Agglomération parisienne	18%

	Femmes n= 521
Professions	
CSP +	29%
CSP -	41%
Inactifs	30%
Statut marital	
Célibataire	33%
En couple	39%
Pacsé ou marié	28%
Nombre d'enfants	
Sans enfant	44%
1 enfant	17%
2 enfants	24%
3 enfants et plus	15%
Détenteur d'une mutuelle	
Oui	96%
Non	4%

RESULTATS



1


Etat de santé général et suivi médical



Etat de santé général

Q1. Tout d'abord, comment jugez-vous votre état de santé en général ?

En %



 Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Etat de santé général

Différences significatives

Q1. Tout d'abord, comment jugez-vous votre état de santé en général ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total		Total	
SOUS TOTAL BON	76%	+ 18-24 ans (92%) + 25-34 ans (85%) + 35-39 ans (86%) - 40 ans et plus (70%) + CSP + (83%)	80%	+ 16-17 ans (91%) - 40 ans et plus (74%) + CSP + (86%) - Inactifs (74%)
Très bon état de santé	17%	+ 18-24 ans (32%) + 25-34 ans (25%) - 40 ans et plus (12%)	20%	+ 16-17 ans (43%) + 18-24 ans (29%) - 40 ans et plus (14%)
Etat de santé moyen	20%	- 18-24 ans (7%) - 25-34 ans (13%) + 40 ans et plus (25%) + Inactifs (26%)	16%	+ 40 ans et plus (21%)
SOUS TOTAL MAUVAIS	4%		3%	+ 50 ans et plus (6%) + Inactifs (7%)
Mauvais	4%	+ Femmes (5%) vs Hommes (2%)	3%	

Un suivi important par des professionnels de santé

Q2 : Quels sont tous les professionnels de santé que vous avez consultés pour vous-même au cours des 12 derniers mois ?

En %



* Uniquement pour les femmes de l'échantillon national représentatif (% à lire sur une base de 521).

 Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Suivi par des professionnels de santé

Différences significatives

Q2 : Quels sont tous les professionnels de santé que vous avez consultés pour vous-même au cours des 12 derniers mois ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total		Total	
Le médecin généraliste	85%	<ul style="list-style-type: none"> + Femmes (90%) - 18-24 ans (67%) + 50 ans et plus (90%) + Petites villes : moins de 20 000 habitants (92%) - Célibataire (79%) + Pacsé ou marié (90%) - Sans enfants (80%) - Sans mutuelle (64%) - Très bon état de santé (70%) 	85%	<ul style="list-style-type: none"> + Etat de santé moyen (96%) - Très bon état de santé (75%)
Le dentiste	58%	<ul style="list-style-type: none"> - 18-24 ans (40%) - Sans d'enfants (50%) 	59%	<ul style="list-style-type: none"> + 16-17 ans (91%) - 18-24 ans (47%) + 50 ans et plus (68%)
Le gynécologue ou l'obstétricien*	54%	<ul style="list-style-type: none"> + 25-34 ans (70%) 	57%	<ul style="list-style-type: none"> + Sous total en couple (63%) - 16-17 ans (37%) - 55-64 ans (46%) - Nord Ouest (50%) - Sans mutuelle (32%) - Sous total mauvais état de santé (36%)
L'ophtalmologue	40%	<ul style="list-style-type: none"> - 35-39 ans (29%) + 50 ans et plus (48%) + Femmes (45%) vs Hommes (35%) 	43%	<ul style="list-style-type: none"> + 50 ans et plus (52%) - Entre 20 000 et 99 000 habitants (34%) - Sans mutuelle (21%) - Très bon état de santé (35%)

* Uniquement pour les femmes de l'échantillon national représentatif (% à lire sur une base de 521).

Suivi par des professionnels de santé

Différences significatives

Q2 : Quels sont tous les professionnels de santé que vous avez consultés pour vous-même au cours des 12 derniers mois ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans


Base : 1033

	Total		Total	
Le cardiologue	15%	+ 40 ans et plus (21%) - CSP + (9%) - CSP - (8%) + Inactifs (24%) - Rural (8%)	7%	+ 40 ans et plus(10%)
L'endocrinologue/nutritionniste	6%		6%	+ 25-34 ans (10%) + Sous total mauvais état de santé (72%)
Un autre professionnel de santé	25%	- 18-24 ans (11%)	23%	+ Sous total mauvais état de santé (18%)
Aucun professionnel	4%	+ 18-24 ans (11%) + Sans mutuelle (12%) - Avec enfants (2%)	3%	

Un report ou renoncement qui concerne 1/3 des femmes

Q3 : Au cours de ces mêmes 12 derniers mois, avez-vous dû pour vous-même

En %



Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Report ou renoncement à un rdv médical

Différences significatives

Q3 : Au cours de ces mêmes 12 derniers mois, avez-vous dû pour vous-même

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total		Total	
Reporter un rendez-vous médical	14%	+ Femmes (19%) vs Hommes (9%) + 25-34 ans (21%) + Agglomération parisienne (21%)	19%	+ 18-24 ans (27%) - 50 ans et plus (12%) + Sous total mauvais état de santé (45%) - 65 ans et plus (9%)
Renoncer à acheter des médicaments en raison de leur coût	7%	+ Femmes (10%) vs Hommes (5%) - 65 ans et plus (2%)	11%	- Sous total Très bon état de santé (5%)
Renoncer à un rendez-vous médical du fait de son coût	7%	+ Femmes (9%) vs Hommes (4%) - 65 ans et plus (2%)	12%	- 35-39 ans (6%) - Pacsé ou marié (7%)
Renoncer à un rendez-vous médical en raison de l'éloignement géographique du cabinet	4%	+ Femmes (6%) vs Hommes (2%)	7%	
Aucun de ces cas	75%	+ Hommes (82%) vs Femmes (69%) + 50 ans et plus (83%) - 25-34 ans (65%) - CSP - (69%)	65%	+ 50 ans et plus (74%) + Très bon état de santé (80%) - Sous total mauvais état de santé (43%)

1

Etat de santé général et suivi médical


FOCUS
Suivi gynécologique



Un report ou renoncement qui concerne 1/5^{ème} des femmes

Q4 : Et plus particulièrement toujours au cours de ces 12 derniers mois, votre conjointe a-t-elle dû ?
Et plus particulièrement toujours au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous dû ?

En %



Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Report ou renoncement à un rendez-vous gynécologique

Différences significatives

Q4 : Et plus particulièrement toujours au cours de ces 12 derniers mois, votre conjointe a-t-elle dû ?
Et plus particulièrement toujours au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous dû ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : Toutes les femmes et
Hommes vivants en couple
(n=862)

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total		Total	
Renoncer à un rendez-vous avec un gynécologue ou un obstétricien en raison des délais d'obtention du rendez-vous	8%	+ 25-34 ans (15%)	12%	+ 18-24 ans (20%) - 55-64 ans (3%)
Renoncer à un rendez-vous avec un gynécologue ou un obstétricien du fait de son coût	4%	+ Agglomération parisienne (8%) + Sans mutuelle (12%)	5%	+ 18-24 ans (11%) - Rural (1%)
Renoncer à un rendez-vous avec un gynécologue ou un obstétricien du fait de l'éloignement géographique	3%	+ Femmes (4%) vs Hommes (1%)	4%	
Renoncer à acheter un contraceptif ou un produit gynécologique en raison de son coût	1%	+ 25-34 ans (6%)	6%	+ Ile de France (11%) - 40 ans et plus (3%)
Aucun de ces cas	83%	+ 50 ans et plus (88%) + Inactifs (88%)	78%	- 18-24 ans (69%) + 55-64 ans (86%) - Ile de France (68%) + Nord Est (84%)

Un suivi gynécologique inégal

Femmes

16-60 ans

Base : 1033


Q5 : Quel professionnel assure votre suivi gynécologique régulier ?

Q6 : Quand pour la dernière fois avez-vous vu un médecin pour votre suivi gynécologique ?


Q7: Quand avez-vous fait pour la dernière fois un frottis chez votre gynécologue ou votre médecin ?

En %


Professionnel de santé assurant le suivi gynécologique



Dernier suivi gynécologique



Dernier frottis



Suivi gynécologique

Différences significatives

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

Q5 : Quel professionnel assure votre suivi gynécologique régulier ?

En %

	Total	
Suivi gynécologique par un gynécologue en cabinet	56%	+ CSP + (64%)
Suivi gynécologique par un médecin généraliste	12%	+ 16/17 ans (29%) + Nord Ouest (22%)
Aucun suivi gynécologique	19%	+ 16/17 ans (32%) et 18/24 ans (35%) + Inactifs (26%) + Célibataire (30%) + N'ayant pas de mutuelle (42%) + Etant en mauvaise santé (37%) + Ne voyant aucun professionnel (45%)

Suivi gynécologique

Différences significatives

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

Q6 : Quand pour la dernière fois avez-vous vu un médecin pour votre suivi gynécologique ?

En %

	Total	
Médecin vu pour suivi gynécologique 12 derniers mois	58%	+ 25/34 ans (68%) + pacsé ou marié (66%)
Médecin vu pour suivi gynécologique + 5 ans	6%	+ 55/64 ans (18%) + n'a vu aucun professionnel au cours des 12 derniers mois (29%)
Jamais vu de médecin pour le suivi gynécologique	6%	+ 16/17 ans (30%) et 18/24 ans (17%) + inactive (10%) + célibataire (15%) et sans enfants (13%) + n'ayant pas de mutuelle (26%)

Suivi gynécologique

Différences significatives

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

Q7: Quand avez-vous fait pour la dernière fois un frottis chez votre gynécologue ou votre médecin ?

En %

	Total	
Frottis effectué 12 derniers mois	42%	+ 25/34 ans (53%)
Frottis effectué + 5 ans	6%	+ 45 ans (15%) + état de santé moyen (13%)
Jamais effectué de frottis	11%	+ 16/17 ans (85%) et 18/24 ans (31%) + inactive (24%) + célibataire (28%) et sans enfants (25%) + n'ayant pas de mutuelle (32%)

Suivi gynécologique

Echantillon national
représentatif 18+

Base : 521 femmes


Q5 : Quel professionnel assure votre suivi gynécologique régulier ?

Q6 : Quand pour la dernière fois avez-vous vu un médecin pour votre suivi gynécologique ?


Q7 : Quand avez-vous fait pour la dernière fois un frottis chez votre gynécologue ou votre médecin ?

En %


Professionnel de santé assurant le suivi gynécologique



Dernier suivi gynécologique



Date dernier frottis



2

Contraception




Un niveau d'information sur la contraception jugé suffisant

Q8 : Tout d'abord comment jugez-vous votre niveau d'information sur la contraception. Diriez-vous qu'il est

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : femmes âgées de 16 à 45 ans
et hommes en couple (n=575)*



Oui, tout à fait suffisant

Oui, plutôt suffisant


Non, plutôt pas suffisant

Non, pas du tout suffisant

Femmes

16-60 ans

*Base : femmes âgées de 16 à 45
ans (n=737)*



**93% Niveau
d'information
jugé suffisant**

Niveau d'information sur la contraception

Différences significatives

Q8 : Tout d'abord comment jugez-vous votre niveau d'information sur la contraception. Diriez-vous qu'il est

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : femmes âgées de 16 à 45 ans et
hommes en couple (n=575)*

Femmes

16-60 ans

*Base : femmes âgées de 16 à 45
ans (n=737)*

	Total		Total	
Tout à fait suffisant	52%	+ femmes (59%) vs hommes (48%) + Pacsé/marié (57%) vs célibataire (42%) + en très bonne santé (68%)	51%	+ 40 ans et + (69%) + ayant 3 enfants (68%) + en très bonne santé (65%)
Plutôt suffisant			41%	+ 16/17 ans (58%) vs 40 ans et + (24%)
Plutôt insuffisant			6%	+ moins de 20 000 habitants (11%)

La pilule, 1^{er} mode de contraception utilisé

Mode de contraception actuel

Q9 : (Hommes) : Quel est le mode de contraception actuel de votre conjointe ? / (Femmes) : Quel est votre mode de contraception actuel ?

En %



  Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Mode de contraception actuel

Différences significatives

Q9 : (Hommes) : Quel est le mode de contraception actuel de votre conjointe ? / (Femmes) : Quel est votre mode de contraception actuel ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : femmes âgées de 16 à 45 ans et
hommes en couple (n=575)*

Femmes

16-60 ans

*Base : femmes âgées de 16 à 45
ans (n=737)*

	Total		Total	
Pilule	35%	+ femmes (52%) + 18/39 ans (53%) + CSP- (45%) + célibataires (56%), sans enfants (47%)	43%	+ 18/24 ans (54%) + sans enfants (49%) vs avec (35%)
Préservatif	11%	+ 18/34 ans (21%) + aggro parisienne (19%) + sans enfants (17%)	14%	+ célibataires (22%) + sans enfants (18%) vs avec (9%)
Stérilet	12%	+ 35/54 ans (23%) + pacsé/marié (20%) + avec enfants (19%)	13%	+ 40 ans et plus (21%) + en couple (18%) + avec enfants (25%)
Aucun moyen	39%	+ hommes (52%) + 55 ans et + (84%) + inactifs (68%) + santé moyenne (60%)	26%	+ 16/17 ans (43%) + célibataires (33%) + sans enfants (31%) vs avec (21%)

La femme, 1^{ère} décisionnaire du mode de contraception

Q10 : Comment s'est fait le choix du contraceptif utilisé dans votre couple ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : femmes 18/45 ans et hommes en couple
dont la femme utilise un contraceptif (n=343)*

**Femmes
16-60 ans**

*Base : femmes de 16/45 ans
utilisant un contraceptif (n=538)*

C'est ma conjointe qui a pris la décision /
C'est moi qui ai pris la décision

57

**La femme est la
principale
décisionnaire**

58

Nous en avons discuté avec ma(mon)
conjoint(e) et l'avons choisi ensemble

23

16

C'est le médecin qui l'a recommandé à ma
conjointe / C'est le médecin qui me l'a
recommandé


16

23

Autre cas

4

3

 Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Mode de décision concernant le choix du contraceptif

Différences significatives

Q10 : Comment s'est fait le choix du contraceptif utilisé dans votre couple ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : femmes 18/45 ans et hommes en couple
dont la femme utilise un contraceptif (n=343)*

**Femmes
16-60 ans**

*Base : femmes de 16/45 ans
utilisant un contraceptif (n=538)*

	Total		Total
C'est ma conjointe qui a pris la décision / C'est moi qui ai pris la décision	57%	- Pacsé ou marié (43%)	58%
Nous en avons discuté avec ma(mon) conjoint(e) et l'avons choisi ensemble	23%	Femmes (14%) vs (34%) Hommes - Célibataire (5%)	16% - Célibataire (8%)
C'est le médecin qui l'a recommandé à ma conjointe / C'est le médecin qui me l'a recommandé	16%	Femmes (21%) vs (10%) Hommes	23%

Efficacité et conseil du médecin : principaux critères de choix

Q11 : Quels ont été les critères de choix de ce contraceptif / du contraceptif de votre conjointe, en 1^{er}, en 2nd et en 3^{ème} ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**


*Base : femmes 18/45 ans et hommes en couple
dont la femme utilise un contraceptif (n=343)*

Femmes

16-60 ans

*Base : femmes de 16/45 ans
utilisant un contraceptif (n=538)*

■ 1^{er} critère ■ Ensemble des citations



○ ○ Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Principaux critères de choix du contraceptif

Différences significatives

Q11 : Quels ont été les critères de choix de ce contraceptif / du contraceptif de votre conjointe, en 1^{er}, en 2nd et en 3^{ème} ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

**Femmes
16-60 ans**

*Base : femmes 18/45 ans et hommes en couple
dont la femme utilise un contraceptif (n=343)*

*Base : femmes de 16/45 ans
utilisant un contraceptif (n=538)*

Ensemble des citations

	Total		Total
Le conseil du gynécologue/du médecin	51%	+ 40 ans et plus (62%)	49%
L'absence ou le peu d'effets secondaires	42%	+ Agglomération 20 000 à 99 000 habitants (64%)	48%
Un moyen qui convienne aussi bien à la femme qu'à l'homme	31%		24% + 18-24 ans (34%)
Le fait que le contraceptif soit remboursé	26%	+ Femmes (32%) vs Hommes (20%) - Ile de France (13%)	33%
Le peu de risques d'oubli	24%	+ 40-44 ans (37%)	29% + Avec enfants (38%) - Sans enfants (21%)
Le conseil d'une amie/de l'entourage	7%	+ 18-24 ans (20%)	5% + Sud Ouest (12%)

3


L'Interruption Volontaire de Grossesse



Entre 1/4 et 1/3 des répondants ont une connaissance partielle de l'IVG

Q12 : Si l'on s'intéresse maintenant à l'IVG (interruption volontaire de grossesse), selon vous l'IVG se fait-elle par...

En %



○ ○ ○ Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Entre 1/4 et 1/3 des répondants ont une connaissance partielle de l'IVG

Q12 : Si l'on s'intéresse maintenant à l'IVG (interruption volontaire de grossesse), selon vous l'IVG se fait-elle par...

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total		Total	
Intervention chirurgicale seulement	28%	- 25-34 ans (15%) + 50 ans et plus (38%) + Hommes (35%)	19%	+ 50 ans et plus (29%)
Intervention chirurgicale et médicament	61%	+ 25-34 ans (72%) + Femmes (67%) - 50 ans et plus (52%)	73%	+ CSP+ (80%) - 50 ans et plus (66%)
Ne sait pas	5%	+ Agglomération parisienne (9%)	3%	

Le gynécologue : 1^{er} interlocuteur en cas d'IVG

Q13 : Et selon vous à qui faut-il s'adresser pour faire une IVG (interruption volontaire de grossesse) ? En assisté

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033



Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Connaissance de l'IVG : les interlocuteurs

Différences significatives

Q13 : Et selon vous à qui faut-il s'adresser pour faire une IVG (interruption volontaire de grossesse) ? En assisté

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033


	Total		Total	
Le gynécologue/l'obstétricien	58%	+ 45-54 ans (67%) + CSP+ (68%) - 65 ans et plus (40%)	69%	- 50 ans et plus (61%)
Un centre spécialisé dans les IG	44%	- CSP- (35%)	46%	
Un planning familial	43%	+ 18-24 ans (56%) + Femmes (49%) vs Hommes (36%)	46%	- 35-39 ans (35%)
L'hôpital ou la clinique	43%	+ 18-24 ans (60%) + 25-34 ans (52%) + Sans enfant (51%) + Femmes (47%) vs Hommes (38%)	53%	- 50 ans et plus (43%)
Le médecin généraliste	29%	- 65 ans et plus (12%)	39%	- 50 ans et plus (29%)
Ne sait pas	6%	+ Hommes (8%) vs Femmes (4%)	3%	+ Agglomération parisienne (9%)
Nombre moyen de citations	2,3	+ 18-24 ans (2,8 citations) + CSP+ (2,6 citations)		

Recours à l'IVG : plus d'une femme sur 10 concernée

Q14 : Votre conjointe a-t-elle déjà eu recours à l'IVG ? / Avez-vous déjà eu recours à l'IVG ?

**Echantillon national
représentatif 18+**


Base : toutes les femmes et
hommes en couple (n=862)



Femmes

16-60 ans

Base : 1033



 Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Recours à l'IVG : plus d'une femme sur 10 concernée

Q14 : Votre conjointe a-t-elle déjà eu recours à l'IVG ? / Avez-vous déjà eu recours à l'IVG ?

**Echantillon national
représentatif 18+**

*Base : toutes les femmes et
hommes en couple (n=862)*

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

	Total	Total
Recours à l'IVG	12% + 55-64 ans (19%) + Célibataires (18%) vs. en couple (11%) - 18-24 ans (4%) - 25-34 ans (6%)	16% + 50 ans et plus (26%) + 45-54 ans (21%) + Mères (20%) - 16-17 ans (-) - 18-24 ans (7%)

*Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.*

4

La grossesse



Difficultés rencontrées : près d'1/4 des femmes concernées

Q15 : (Hommes) : Votre conjointe a-t-elle rencontré des difficultés d'accès aux soins pendant sa grossesse ?

(Femmes) : Avez-vous pendant votre grossesse rencontré des difficultés d'accès aux soins ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 631 individus avec enfants

Femmes

16-60 ans

Base : 578 femmes avec enfants

Sous total au moins une difficulté...	13	Nombre moyen de difficultés: 1,6	23	Nombre moyen de difficultés: 1,8
liée au manque de coordination entre les différents services de la maternité	3		6	
en raison de l'éloignement de la maternité de mon domicile	3		4	
après l'accouchement	3		8	
pour l'inscription à la maternité (hôpital/clinique)	2		5	
financière en raison des nombreux frais liés à la grossesse et de l'absence de remboursement pour certains soins	2		4	
en raison du manque d'information sur les examens à réaliser pendant la grossesse et les endroits où les réaliser	2		3	
pour réaliser les examens sanguins recommandés	1		2	
pour réaliser les trois échographies recommandées	1		1	
autres difficultés	4		5	
Non aucune difficulté particulière	86		77	

Non réponse

Difficultés rencontrées : près d'1/4 des femmes concernées

Q15 : (Hommes) : Votre conjointe a-t-elle rencontré des difficultés d'accès aux soins pendant sa grossesse ?

(Femmes) : Avez-vous pendant votre grossesse rencontré des difficultés d'accès aux soins ?

En %

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 631 individus avec enfants

Femmes

16-60 ans

Base : 578 femmes avec enfants

	Total		Total	
Sous-Total Au moins une difficulté rencontrée lors de la grossesse	13%	+ 25-34 ans (24%) + 35-39 ans (30%)	23%	+ 25-34 ans (29%) + 35-39 ans (35%) - 40 ans et plus (17%)
liée au manque de coordination entre les différents services de la maternité	3%	+ Femmes (4%) vs Hommes (1%)	6%	
en raison de l'éloignement de la maternité de mon domicile	3%	+ Femmes (5%) vs Hommes (2%) + 35-39 ans (10%) + Sud-Ouest (9%) + Sud-Est (8%)	4%	+ Rural (8%) - Villes moyennes : 20 000 à 99 000 hab. (0%) et 100 000 habitants et plus (1%)
après l'accouchement	3%	+ 25-34 ans (10%) + 35-39 ans (11%)	8%	+ Agglomération parisienne (16%) vs. Villes moyennes 20 000 à 99 000 habitants (2%)
pour l'inscription à la maternité (hôpital/clinique)	2%	+ 25-34 ans (7%) + Agglomération parisienne (7%)	5%	+ 35-39 ans (11%) + Agglomération parisienne (12%)
Non, aucune difficulté particulière	86%	+ Hommes (90%) vs Femmes (83%) + 50 ans et plus (92%) - 25-34 ans (75%) - 35-39 ans (70%)	77%	- 25-34 ans (65%) + 40 ans et plus (83%)

6

La ménopause



Mammographies : 2 femmes sur 10 insuffisamment suivies


Q16: Quand avez-vous effectué pour la dernière fois une mammographie ?

En %

Femmes de 50 ans et plus

**Echantillon national
représentatif 50+**

Base : 250



Il y a moins de 12 mois

Entre 12 mois et moins de 2 ans

Entre 2 ans et moins de 5 ans

Il y a plus de 5 ans


Je n'en ai jamais fait

Non réponse

Femmes

50-60 ans

Base : 207



19%

Traitement substitutif : 1 femme sur 2 n'en a jamais pris

Q17: Prenez-vous actuellement un traitement afin d'alléger les symptômes de la ménopause ?

En %

Femmes de 50 ans et plus

**Echantillon national
représentatif 50+**

Base : 250



Oui, j'en prends un
actuellement

Non, mais j'en ai pris un par
le passé

Non et je n'en ai jamais pris

Je ne suis pas encore
ménopausée
Non réponse

**Femmes
50-60 ans**

Base : 207



Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

7

Opinion sur le système de soin français



Un avis critique sur le système de soin français

Q18: Enfin et pour terminer sur ce sujet, voici quelques affirmations à propos du système de santé français.
Merci de me dire pour chacune des affirmations si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

Sous-total D'accord (en %)



 Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de confiance de 95%.
En d'autres termes, il y a 95% de chances que l'écart constaté ne soit pas dû au hasard.

Avis sur le système de soin français

Q18: Enfin et pour terminer sur ce sujet, voici quelques affirmations à propos du système de santé français.

Merci de me dire pour chacune des affirmations si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

**Echantillon national
représentatif 18+**

Base : 1002

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

<u>Sous-total D'accord (en %)</u>	Total		Total	
Est devenu un système à deux vitesses (un pour les riches, un pour les pauvres)	68%	- 65 ans et plus (56%)	70%	+ 40 ans et plus (77%) - Femmes en très bon état de santé (61%)
Est trop coûteux	65%	+ CSP- (76%) - CSP+ (57%) + Villes de - de 20 000 hab. (76%) - Paris (56%) + Femmes (70%) vs Hommes (59%)	68%	+ 40 ans et plus (74%) + CSP- (74%) - CSP + (61%)
Permet d'être soigné dans des délais raisonnables	64%	+ 65 ans et plus (74%) + Grandes villes (100 000 hab. et plus) (70%)	56%	- Femmes en mauvais état de santé (28%)
Permet à toutes les femmes d'être bien soignées	63%	+ Grandes villes (100 000 hab. et plus) (71%) + Hommes (67%) vs Femmes (59%)	60%	- Femmes en mauvais état de santé (39%)
Ne permet pas à toutes les femmes d'accéder à la contraception qu'elles souhaitent	38%		46%	+ CSP- (53%) - CSP+ (39%)
Ne permet pas à toutes les femmes d'accoucher dans des conditions favorables	38%	+ CSP- (46%) - Mères de 4 enfants et plus (21%)	40%	+ 40-44 ans (50%) + Femmes en mauvais état de santé (57%)

Avis sur le système de soin français


Détail des réponses

Echantillon national
représentatif 18+

Q18: Enfin et pour terminer sur ce sujet, voici quelques affirmations à propos du système de santé français. Merci de me dire pour chacune des affirmations si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : 1002

En %



Avis sur le système de soin français

Détail des réponses


Q18: Enfin et pour terminer sur ce sujet, voici quelques affirmations à propos du système de santé français. Merci de me dire pour chacune des affirmations si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Femmes

16-60 ans

Base : 1033

En %



SYNTHESE



Etat de santé général et suivi médical

▶ **Un bon état de santé général pour une majorité des interviewés**

- ▶ Qu'ils appartiennent à l'échantillon national représentatif ou à l'échantillon des femmes âgées de 16 à 60 ans, **l'état de santé est perçu comme bon ou très bon par une majorité** des interviewés (près de 80%). Les jeunes (18/39 ans) ainsi que les CSP+ sont en meilleure santé que les autres interviewés.

▶ **Mais un suivi par les professionnels de santé qui est inégal, notamment chez les femmes**

- ▶ Si une **majorité des interviewés déclare avoir vu au moins un professionnel** au cours des 12 derniers mois (et en moyenne près de 3 professionnels), il s'agit **principalement du médecin généraliste** (pour plus de 8 personnes sur 10), du dentiste (6 personnes sur 10), et du gynécologue (pour plus d'une femme sur 2).
- ▶ Entre 1/4 (pour l'échantillon représentatif) et **1/3 (pour l'échantillon femmes) des personnes déclarent avoir dû reporter ou renoncer** à un rendez-vous médical ou à des médicaments.
- ▶ Il en est de même en ce qui concerne les **rendez-vous avec un gynécologue/obstétricien ou les produits gynécologiques : près d'une femme sur 4** déclare avoir déjà renoncé ou reporté un rendez-vous au cours de l'année écoulée.
- ▶ Ce qui peut expliquer que près **d'une femme sur 5 ne bénéficie d'aucun suivi gynécologique régulier** (et que même environ 1 femme sur 10 n'ait pas vu depuis plus de 5 ans ou n'ait jamais vu un médecin pour ce suivi) et que **près d'une femme sur 5 n'ait pas fait de frottis** depuis plus de 5 ans (ou n'en ait jamais fait). Parmi les femmes non suivies, on notera qu'il y a davantage de femmes jeunes, sans mutuelle et célibataires.

Contraception utilisée et origine du choix

- ▶ **Plus de 9 personnes sur 10**, qu'il s'agisse de l'échantillon national représentatif ou de l'échantillon femmes, déclarent que **l'information sur la contraception est suffisante** (dont plus de la moitié tout à fait suffisante). Les femmes ainsi que les personnes jouissant d'une très bonne santé sont encore plus nombreuses à le déclarer.
- ▶ Les **¾ des femmes âgées de 16 à 60 ans** (et les 2/3 de l'échantillon représentatif) **sont d'ailleurs sous contraceptif**, et **principalement sous pilule** (pour près de la moitié d'entre elles), et de façon équivalente sous stérilet ou préservatif (pour une femme sur 10).
- ▶ On notera néanmoins **qu'elles n'utilisent dans leur très grande majorité qu'un seul moyen de contraception**. Cela signifie donc que les utilisatrices de préservatif ne se protègent par aucun autre moyen complémentaire et permet de relativiser le niveau d'information perçu sur la contraception.
- ▶ La **contraception demeure pour plus des 2/3 des personnes interrogées une affaire de femmes**. La recommandation du médecin n'intervient que dans un quart des cas environ et le choix par le couple dans environ un cas sur 10 (et de façon plus importante au sein de l'échantillon national représentatif qui donnait aussi la parole aux hommes !).
- ▶ Enfin ce sont principalement **l'efficacité du contraceptif** (cité à plus de 70%) mais également **le conseil du médecin et la bonne tolérance** (environ 50%) qui orientent le **choix du contraceptif**. On notera néanmoins que le critère financier n'est pas absent puisque pour 1/3 des femmes il intervient également dans le choix du mode de contraception.

Connaissance et recours à l'IVG

- ▶ **1/4 des femmes et près d'un tiers de l'échantillon national représentatif ne connaissent pas la possibilité de recourir à l'IVG à la fois par une intervention chirurgicale et par un médicament.**
- ▶ **On notera que les hommes mais également les personnes âgées de plus de 50 ans** sont celles qui connaissent le moins l'existence de ces deux types d'IVG, probablement car le médicament est plus récent. Alors qu'à l'inverse les femmes, les personnes âgées de 25 à 34 ans ainsi que les CSP+ ont un niveau de connaissance en la matière au-dessus de la moyenne.
- ▶ En cas de besoin ils s'adresseraient **en premier au gynécologue/obstétricien**, puis pour les femmes **à un hôpital/clinique ou un centre de planning familial** (on notera que l'échantillon des femmes 16/60 ans citent un plus grand nombre d'interlocuteurs que l'échantillon représentatif).
- ▶ Enfin **plus d'une femme sur 10 déclare avoir déjà eu recours à l'IVG**. Les femmes âgées de plus de 50 ans y ont davantage eu recours que le reste de la population.

Grossesse et ménopause

▶ Difficultés liées à la grossesse : 1 femme sur 4 concernée

- ▶ **Une femme sur 4** déclare en effet avoir rencontré des difficultés lors de sa grossesse et en moyenne **près de 2 difficultés**.
- ▶ **Les difficultés déclarées sont très « éparpillées »** et concernent aussi bien la maternité (manque de coordination, éloignement du domicile, problème lors de l'inscription) que la période après l'accouchement, la réalisation des examens recommandés ou encore des difficultés financières ou liées au manque d'information.

▶ Ménopause : un suivi des femmes inégal

- ▶ **Près d'une femme sur 5 n'a pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans** (et 10% depuis plus de 5 ans ou jamais).
- ▶ **Et plus d'une femme sur 2 n'a encore jamais reçu de traitement pour alléger les symptômes liés à la ménopause** (et même près des 2/3 des femmes déjà ménopausées).

Opinion sur le système de soin français

- ▶ **Un avis critique sur le système de soin français**
 - ▶ **Plus des 2/3 des personnes interrogées s'accordent pour déclarer que le système de santé français est à deux vitesses et qu'il est trop coûteux.**
 - ▶ **Entre la moitié et 1/3 d'entre eux pensent également que ce système ne permet pas d'être soigné dans des délais raisonnables et de bien soigner les femmes**
 - ▶ **Enfin un peu moins de la moitié d'entre eux critiquent l'accès à la contraception souhaitée par les femmes et les conditions dans lesquelles est pratiqué l'accouchement.**
 - ▶ **On notera que les femmes, les personnes âgées de 40 ans et plus, ainsi que les CSP- (qui ont sans doute accès moins facilement au système de soin) sont les plus critiques.**